赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 接骨木

新訂和漢薬 記載頁

066

基源 スイカズラ科ニワトコ Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana Hara(=S. sieboldiana Bl.)の枝茎, 根皮,葉,花.

部位 枝葉, 根皮(接骨木);

葉:

花.

作用 枝葉,根皮(接骨木):

無毒 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草網目], 或有小毒 [本草網目]. 続筋骨 [新修本草, 千金翼方, 証 類本草, 本草網目], 瀉下 [和蘭薬鏡], 利尿 [遠西名物, 和蘭薬鏡], 発汗 [遠西名物].

葉:

痰瘧 [証類本草, 本草網目].

花:

発汗,鎮痙[和蘭薬鏡].

応用 枝葉,根皮(接骨木):

折傷 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草網目, 大和本草], 風癢, 齲歯 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草網目], 痰飲 [本草網目, 多識編] [= 留飲停水 [和蘭薬鏡]], 水腫 [本草網目, 多識編, 和蘭薬鏡], 痰瘧 [本草網目, 多識編], 産婦悪血 [多識編].

葉:

無し.

花:

痙攣拘急,傷冷毒痛, 痰欬,痛風,神経熱,瘡疹,痘瘡,麻疹, 困喉痛 [和蘭薬鏡].

処方 枝葉, 根皮(接骨木): 順血散〔打撲〕.

備考 別名: 続骨木 [本草和名, 医心方].