

# 赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 牽牛

新訂和漢薬 記載頁

141

基源 ヒルガオ科アサガオ *Pharbitis nil* Choisy. の種子。或は アメリカアサガオ *Ph. hederacea* Choisy. を充つ。

部位 種子（牽牛子，黒丑，白丑）：炒[福田方]，酒拌晒乾[本草綱目]，水洗剉細[一本薬選]。

作用 有毒。利小便[新修本草，千金異方，証類本草，本草綱目，一本薬選，満洲漢薬]，下気[新修本草，千金異方，証類本草，本草綱目]，利大便[証類本草，本草綱目] (=瀉下[満洲漢薬])，消腫，殺虫[満洲漢薬]，落胎[証類本草，本草綱目] (=墮胎[満洲漢薬])，妊婦勿服[一本薬選]。

応用 脚満水腫，風毒[新修本草，千金異方，証類本草，本草綱目]，蠱毒，腰痛[証類本草，本草綱目]，一切気壅滞[証類本草，本草綱目，一本薬選]，大腸気秘風秘[本草綱目] (=腸結[邦産薬植])。

処方 金鈴円[疝痛]，牽牛円[便秘]，牽牛五霊煮散，神応散[水腫]，搗虎散[痛風]，牽牛子丸[脚気]，牽牛子丸，烏竜丸[疥瘡]。

備考