

赤松金芳著「新訂和漢藥」より

生薬名 楊梅

新訂和漢藥 記載頁

529

基源 ヤマモモ科ヤマモモ *Myrica rubra* S. et Z. の樹皮, 果実, 核仁.

部位 樹皮, 果実, 核仁: 柿渋拌暴 [本草綱目].

作用 樹皮(楊梅皮):

下氣, 痀虫, 除惡毒 [本朝食鑑], 消食 [本朝食鑑, 一本薬選], 開痰, 滌腸胃 [一本薬選].

果実(楊梅実):

無毒, 或微毒. 去痰, 和五臟, 除煩 [証類本草, 万安方, 本草綱目], 消食, 滌腸胃 [証類本草, 万安方, 本草綱目, 本朝食鑑], 下酒, 止渴 [証類本草, 本草綱目] (=止嘔渴 [本朝食鑑]), 除惡氣 [本朝食鑑].

核仁(楊梅仁):

無し.

応用 樹皮(楊梅皮):

惡瘡, 疥癬 [証類本草, 本草綱目, 本朝食鑑, 大和本草], 牙痛 [本草綱目, 本朝食鑑, 大和本草], 湯火傷 [本草綱目, 本朝食鑑], 犁毒 [本草綱目], 腹痛, 傷食, 虫積 [本朝食鑑, 大和本草], 霍亂, 酒毒 [本朝食鑑], 跌撲損傷 [本朝食鑑, 一本薬選], 頭痛, 腹滿 [一本薬選].

果実(楊梅実):

嘔噦 [証類本草, 万安方, 本草綱目], 下痢 [証類本草, 万安方, 本草綱目, 本朝食鑑], 一切損傷 [証類本草, 本草綱目], 頭痛 [本草綱目], 消渴 [万安方].

核仁(楊梅仁):

脚氣.

処方 樹皮(楊梅皮): 楊柏散[打撲].

備考