

# 赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 柏（側柏）

新訂和漢薬 記載頁

659

**基源** ヒノキ科コノテガシワ *Biota orientalis* Endl. (= *Thuja orientalis* L.)の樹枝、樹瘻、根白皮、葉、子殻、子仁、樹脂。

**部位** 樹枝（柏枝節）；  
樹瘻瘤（柏瘻）；  
根白皮；  
葉（柏葉、側柏葉）：生，炒 [本草綱目]，剉 [国医薬研]；  
子殻（柏子殻）；  
子仁（柏子仁，柏実）：蒸熟春簸炒研 [本草綱目]；  
樹脂（柏脂）。

**作用** 樹枝（柏枝節）：  
無し。

樹瘻瘤（柏瘻）：  
無し。

根白皮：  
無毒。長毛髮 [新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目]。

葉（柏葉、側柏葉）：  
無毒。輕身，益氣，止飢 [新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目]，止痛，殺虫 [本草綱目]，止血，補陰，清熱 [滿洲漢薬]。

子殻（柏子殻）：  
解砒毒 [本綱拾遺]。

子仁（柏子仁，柏実）：  
無毒。益氣，安五藏，耳目聰明，不飢，不老，延年 [神農本草，新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目]，益血，止汗 [新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目]，興陽道，益寿 [証類本草，本草綱目]，潤肝，養心氣，潤腎燥，安魂，定魄，益智，寧神 [本草綱目]，補心，止悸，斂汗，鎮靜 [滿洲漢薬]。

樹脂（柏脂）：  
無し。

**応用** 樹枝（柏枝節）：  
風痺，歷節風，癩疥，癩瘡 [本草綱目]。

樹瘻瘤（柏瘻）：  
胃痛 [本綱拾遺]。

根白皮：  
火灼爛瘡 [新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目]。

葉（柏葉、側柏葉）：  
湿痺 [新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目]，崩中，吐血，衄血 [新修本草，千金翼方，証類本草，本草綱目，滿洲漢薬]，痢血，尿血，歷節風，唐瘡，湯火傷 [証類本草，本草綱目]。

子殻（柏子殻）：  
無し。

子仁（柏子仁，柏実）：

## 赤松金芳著「新訂和漢藥」より

驚悸[神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目, 滿洲漢藥], 風湿痺 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 虚損, 歷節, 腰中痛 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 頭風, 百邪鬼魅, 驚癇 [証類本草, 本草綱目], 虚秘, 腸風下血, 小兒軀啼, 黄水湿瘡, 疥癬 [本草綱目].

樹脂 (柏脂) :  
疣目 [本草綱目].

処方 根白皮 : 青竜五生膏[諸瘡];  
葉 (柏葉、側柏葉) : 柏葉湯, 側柏散[吐血], 断紅円[便血], 清衄湯[鼻血], 柏葉湯[帶下];  
子仁 (柏子仁, 柏実) : 益栄湯[不眠], 寧志膏[驚悸].

備考