

赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 青黛

新訂和漢薬 記載頁

489

基源 タデ科アイ *Persicaria tinctoria* Gross. (= *Polygonum tinctorium* Lour.) の葉及びその製品, 子実.

部位 葉;
藍澱 (藍葉を醗酵して生ずる塊);
青黛 (藍葉より得る藍青色軽鬆粉末);
子実 (藍実).

作用 葉:
無毒. 殺百葉毒, 解毒 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目].

藍澱 (藍葉を醗酵して生ずる塊):
解諸毒 [証類本草, 本草綱目], 止血, 殺虫 [本草綱目].

青黛 (藍葉より得る藍青色軽鬆粉末):
無毒. 殺虫 [証類本草, 本草綱目], 解毒 [証類本草, 本草綱目, 満州漢薬], 解熱 [本草綱目, 満州漢薬], 止血 [本草綱目], 平肝, 涼血, 安魂魄 [満州漢薬].

子実 (藍実):
無毒. 解諸毒, 殺蟲 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 輕身 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 填骨髓, 明耳目, 利五臟, 調六腑, 利關節, 少睡, 益心力 [証類本草, 本草綱目].

応用 葉:
煩悶, 赤痢, 下血, 欬嗽, 驚癇, 鼈癥, 目赤, 天疱瘡, 唇辺生瘡, 蜂螫毒 [本草綱目].

藍澱 (藍葉を醗酵して生ずる塊):
熱瘡, 禿瘡, 熱腫 [証類本草, 本草綱目], 噎膈 [本草綱目].

青黛 (藍葉より得る藍青色軽鬆粉末):
下血, 熱瘡, 惡腫, 癰瘡, 金瘡, 碗豆瘡, 頭痛, 蛇犬毒, 小兒諸熱, 驚癇, 疔痢 [証類本草, 本草綱目] (= 小兒疳症, 驚悸 [満州漢薬]), 吐血, 咯血, 食積 [本草綱目].

子実 (藍実):
疰鬼 [神農本草, 新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 螫毒 [新修本草, 千金翼方, 証類本草, 本草綱目], 經絡中結氣 [証類本草, 本草綱目], 毒腫 [本草綱目].

処方 葉: 解毒丸(中毒);
青黛: 如聖青金丹(驚癇), 青金散(欬血), 清音丸 [失音], 必勝散(齒衄), 千金消癥丸(疳疾), 解毒丸(中毒).

備考