

赤松金芳著「新訂和漢薬」より

生薬名 櫻櫚（棕櫚）

新訂和漢薬 記載頁

609

基源 ヤシ科シロ Trachycarpus excelsus Wendl., トウシロ T. fortunei Wendl. の樹幹葉鞘, 子実.

部位 樹幹葉鞘（櫻櫚皮, 棕皮, 枳櫚皮）: 烧存性 [本草綱目];
花穂, 子実.

作用 樹幹葉鞘（櫻櫚皮, 棕皮, 枳櫚皮）:
無毒. 破癥, 生肌 [証類本草, 本草綱目], 止血 [証類本草, 本草綱目, 満洲漢薬].

花穂, 子実:
無毒, 或有毒. 洗腸, 養血 [本草綱目].

応用 樹幹葉鞘（櫻櫚皮, 棕皮, 枳櫚皮）:
腸風, 崩中帶下, 鼻衄, 吐血 [証類本草, 本草綱目, 満洲漢薬], 赤白痢 [証類本草, 本草綱目] (=下痢 [満洲漢薬]), 金瘡, 疥癬 [証類本草, 本草綱目], 血淋, 小便不通 [本草綱目].

花穂, 子実:
腸風, 崩中帶下 [証類本草, 本草綱目], 瀉痢 [本草綱目].

処方 樹幹葉鞘（櫻櫚皮, 棕皮, 枳櫚皮）: 黒神散〔胎死〕, 黒聖散〔便血〕.

備考